

# AMPR MARS 2012- Paralyse cérébrale

## QCM d'évaluation

### BONNES REPONSES EN GRAS

La transition du secteur pédiatrique vers le secteur adulte :

- a) S'effectue systématiquement en consultation multidisciplinaire
- b) Se fait sur le plan légal obligatoirement à 18 ans
- c) Se fait sur le plan légal obligatoirement à 15 ans 3 mois
- d) Est organisée par les parents
- e) **Peut être abordée avec le jeune patient dès la pré-adolescence**

1. Dans quelle forme particulière de paralysie cérébrale, l'apparition d'une myélopathie cervicale est-elle classique ?

- a) Diplégie spastique
- b) Tétraplégie spastique
- c) Tétraplégie hypotonique
- d) **Tétraplégie athétoïde**

2. L'infection après arthrodèse D2-sacrum pour scoliose neurologique

- a) Est rare
- b) Nécessite systématiquement l'ablation du matériel
- c) Le germe responsable habituellement est l'E coli
- d) **Est d'autant plus fréquente que la paralysie cérébrale est sévère**

3. Quelle est la première cause de décès dans la population atteinte de paralysie cérébrale :

- a) les causes circulatoires
- b) **les causes respiratoires**
- c) les causes digestives
- d) les causes infectieuses

4. Dans la population atteinte de paralysie cérébrale :

- a) les douleurs sont principalement d'origine viscérale
- b) les douleurs sont la principale cause du déclin fonctionnel
- c) les douleurs sont le plus souvent d'origine neuropathique
- d) **les douleurs sont fréquentes (présentes chez plus de 50 % des personnes)**

5. Le déficit de la vision de reliefs chez l'enfant PC est davantage perturbée en cas de :

- a) **Strabisme**
- b) **Asymétrie importante de l'acuité visuelle**

6. Parmi les troubles suivants lequel perturbe la lecture davantage :

- a) Les troubles de poursuite visuelle
- b) **Les troubles de saccades**

7. La coordination œil-main peut être perturbée
- a) **En l'absence de tout trouble des Membres Supérieurs**
  - b) Systématiquement dans la dyspraxie visuo-spaciale
8. Un enfant de 3 ans avec une subluxation spastique des hanches doit :
- a) Être opéré dès que possible
  - b) Suivre un traitement par toxine botulinique
  - c) Être suivi tous les 6 mois pour un contrôle radiologique
  - d) **Le traitement dépendra des amplitudes d'abduction des hanches**
  - e) Toutes les réponses sont vraies
9. L'excès d'antéversion fémorale chez les enfants présentant une diploégie spastique :
- a) Aura tendance à diminuer au même rythme que chez les enfants sans trouble neurologique
  - b) Doit être traité avant l'âge de 8 ans
  - c) Peut être corrigée avec des attelles de dérotation
  - d) **Est lié à l'âge d'acquisition de la marche**
  - e) Doit être évalué par scanner en cas de traitement chirurgical
10. L'analyse des mouvements généraux se base sur 3 critères. Lesquels (3 bonnes réponses) :
- a) La rapidité des mouvements
  - b) Le retournement dos-ventre
  - c) **La variabilité**
  - d) **La fluidité**
  - e) Les interactions
  - f) **La complexité**
11. Des mouvements généraux nettement anormaux comportent un risque élevé de:
- a) Troubles du comportement
  - b) Troubles de la coordination
  - c) **Paralysie cérébrale**
  - d) Ne comportent aucun risque

Merci de votre participation !!